

PÁGINA	Onde se lê	Deve ler-se
4, linha 2 a contar do fim	A verificação de lanugo e queratina provoca uma reacção inflamatória do ouvido médio, com a verificação de células gigantes como reacção a um corpo estranho...	A presença de lanugo e queratina provoca uma reacção inflamatória do ouvido médio, com o aparecimento de células gigantes como reacção a um corpo estranho...
34, ref. bibliográfica 9	Paparella MM, <i>Annals of Otolaryngology, Rhinology and Laryngology</i> , 1994. Suppl 163: 7-10.	Paparella MM, Schachern P. New developments in treating otitis media. <i>Ann Otol Rhinol Laryngol</i> 1994. Suppl 163: 7-10.
51, linha 18	A presença do RSV, <i>Adenovirus</i> ...	A presença do VRS, <i>Adenovirus</i> ...
61, linha 16	Houver perfuração espontânea.	Houver perfuração precoce.
68, linha 4	A única vacina antiviral no mercado...	Destas, a única vacina antiviral no mercado...
104, linha 8 a contar do fim	As bolsas de retracção não aparecem antes dos dois anos e meio.	As bolsas de retracção não aparecem antes dos três anos.
106, linha 19	... a integridade da cadeia ossicular também se pode observar (Figura 6.6b).	... a integridade da cadeia ossicular também se pode observar (Figura 6.6a).
117, linha 1	...Sadé <i>et al.</i> , em 1883...	...Sadé <i>et al.</i> , em 1983...
135, linha 10	... e a destruição óssea podem aumentar a infecção:	... e a destruição óssea podem estender a infecção: